

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

OCORRÊNCIA DE *Triatoma williami* GALVÃO, SOUZA & LIMA, 1965
COLONIZANDO HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FAZENDA
NOVA, GOIÁS, BRASIL.

Ionizete G. da Silva¹, Heloisa H. G. da Silva¹ e
Miguel Elias²

ABSTRACT

Triatoma williami Galvão, Souza & Lima, 1965 in human dwellings in Fazenda Nova, Goiás, in the central region of Brazil.

Thirty three specimens of *T. williami* were collected: 4, 14, 6 and 4 specimens correspondig respectively to 2nd, 3rd, 4th and 5th nymph stages, and 5 adults.

Triatoma williami é uma espécie silvestre mas seus adultos, esporadicamente, têm invadido o ambiente domiciliar (domicílio e anexos). Tem ocorrência registrada para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (LENT & WIGODZINSKY, 1979 e SILVEIRA *et al.*, 1984). No entanto, em 1989/90 esta espécie foi capturada colonizando o intra domicílio situado sobre a Serra Dourada, município de Fazenda Nova-GO, numa quantidade de 4, 14, 6 e 4 exemplares, respectivamente para 2º, 3º, 4º e 5º estádios ninfais e 5 adultos. Dos capturados, apenas 16 chegaram vivos ao laboratório e, nestes pelo exame das dejeções espontâneas (SILVA, 1990) não foi detectada a presença de *Trypanosoma cruzi*.

Recebido em 19/06/91

¹ Departamento de Parasitologia IPTESP/UFG, Caixa Postal 131, 74000 Goiânia GO.

² SUCAM, Goiânia GO.

LITERATURA CITADA

- LENT, H, & WIGODZINSKY, P. 1979. Revision of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae) and their significance as vectors of Chagas' disease. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 163(3): 127-520.
- SILVA, I.G. (no prelo) da Nova técnica para a leitura do xenodiagnóstico. *Revta goiana Med.*
- SILVEIRA, A.C.; FEITOSA, V.R.; BORGES, R. 1984. Distribuição de triatomíneos capturados no ambiente domiciliar, no período de 1975/84. Brasil. *Revta bras. Malariol. D. trop.* 36: 15-312.